

<b>Produktinformationen</b>	<b>Multilac® Synbiotikum (30 magensaftresistente Kapseln)</b>		
Datum	01.11.2018		
Dateiname	PZN 10069820 Multilac Synbiotikum 30 MRK Vivatrex 2018 11 01 LMIV.doc		
PZN	10069820		
Produktbezeichnung	Multilac® Synbiotikum (Nahrungsergänzungsmittel)		
Hersteller	Vivatrex GmbH Martinstr. 10-12 52062 Aachen Deutschland		
Verzeichnis der Zutaten	Füllstoff – Maisstärke, Füllstoff – vorgelierte Maisstärke, Trägerstoff - Hydroxypropylmethylcellulose E464, Nährstoff – Fructooligosaccharid, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Überzugsmittel – Gellan E418, Lactococcus lactis, Lactobacillus rhamnosus, Trennmittel - Magnesiumsalze von Speisefettsäuren E470b, Überzugsmittel – Schellack E904, Bifidobacterium bifidum, Farbstoff – Titandioxid E171, Streptococcus thermophiles, Stabilisator – L- Ascorbinsäure E300, Bifidobacterium breve, Trägerstoff – Alginsäure E400, Trägerstoff – Triethylcitrat E1505, Verdickungsmittel – Johannisbrotkernmehl E410, Überzugsmittel – Olivenöl.		
Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können (gem. Anhang II <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i> )	Keine. Insbesondere enthält Multilac® Synbiotikum keine Milchbestandteile und ist lactose- und glutenfrei.		
Nährwertdeklaration (gem. <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i> )	Durchschnittliche Nährwertangabe	Pro 100 g	Pro 1 Kapsel tägliche Verzehr- empfehlung
	Brennwert	1570 kJ/370 kcal	6,7 kJ/1,58 kcal
	Fett	0,8 g	0,003 g
	- davon gesättigte Fettsäuren	0,5 g	0,002 g
	Kohlenhydrate	85 g	0,364 g
	- davon Zucker	1,9 g	0,008 g
	Ballaststoffe	4,3 g	0,018 g
	Eiweiß	3,6 g	0,015 g
	Salz	0,28 g	0,001 g

Zutaten mit ernährungs-spezifischer oder physiologischer Wirkung	Zutaten	Inhalt 1 Kapsel tägliche Verzehr-empfehlung
	Fructooligosaccharid (FOS)	63 mg
	Lebende gefriergetrocknete Bakterien von 9 ausgewählten Bakterienstämmen	4,5 Milliarden vermehrungsfähige Bakterien (4,5 x 10 <sup>9</sup> KBE*)
	Lactococcus lactis	9,00 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Lactobacillus helveticus	9,00 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Bifidobacterium longum	6,75 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Bifidobacterium breve	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Lactobacillus rhamnosus	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Streptococcus thermophiles	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Lactobacillus casei	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Lactobacillus plantarum	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	Bifidobacterium bifidum	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*
	*KBE = Kolonien bildende Einheiten	
	Nettofüllmenge	12,84 g (30 magensaftresistente Kapseln, jeweils 0,428 g)
Empfohlene maximale tägliche Verzehrmenge	1 magensaftresistente Kapsel	
Allgemeine Warnhinweise	<p><b>Multilac<sup>®</sup> Synbiotikum</b> darf nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der in <b>Multilac<sup>®</sup> Synbiotikum</b> enthaltenen Stoffe (siehe Zutaten) besteht.</p> <p>Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (<b>1 Kapsel</b>) darf nicht überschritten werden.</p> <p><b>Multilac<sup>®</sup> Synbiotikum</b> kann nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.</p> <p><b>Multilac<sup>®</sup> Synbiotikum</b> unterhalb von 25° C an einem trockenen Ort, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Licht schützen.</p>	
Spezielle Warnhinweise	Keine	
Informationen zur Kapsel	<p>Zur Herstellung von <b>Multilac<sup>®</sup> Synbiotikum</b> werden Kapseln aus Hydroxypropylmethylcellulose verwendet, die frei von Gelatine sind.</p> <p>Magensaftresistente Kapseln dürfen vor der Einnahme nicht geöffnet werden, da sonst der Schutz der Bakterien verlorengeht.</p>	

Einnahmeempfehlung	<p><b>Multilac® Synbiotikum</b> wird oral eingenommen, eine Kapsel pro Tag.</p> <p>Es wird empfohlen <b>Multilac® Synbiotikum</b> vor dem Schlafengehen einzunehmen.</p> <p>Bei der begleitenden Anwendung mit einem Antibiotikum sollten die Einnahme von <b>Multilac® Synbiotikum</b> und des Antibiotikums gleichzeitig begonnen werden. <b>Multilac® Synbiotikum</b> mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Stunden zum Antibiotikum einnehmen. <b>Multilac® Synbiotikum</b> nach dem Ende der Antibiotikatherapie einige Tage weiter einnehmen.</p> <p>Zur begleitenden Einnahme auf Reisen sollte mit der Einnahme von <b>Multilac® Synbiotikum</b> schon 1-2 Tage vor der Anreise begonnen werden.</p> <p><b>Multilac® Synbiotikum</b> kann sicher über längere Zeiträume eingenommen werden.</p>
--------------------	---